

RECOMENDACIONES

ANTES Y DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA



Centro veterinario
ARTEMISA

ESTUDIO PREQUIRÚRGICO RECOMENDADO

Para aumentar la seguridad anestésica, en algunos pacientes recomendamos realizar pruebas preoperatorias. La necesidad exacta depende de la edad, la exploración física y los antecedentes (enfermedades previas, medicación, soplos, tos, intolerancia al ejercicio, etc.).

¿A partir de qué edad recomendamos analítica preoperatoria?

A partir de 5-6 años, y antes si existen signos clínicos, hallazgos en la exploración o enfermedades previas.

Tipos de prequirúrgicos

Prequirúrgico básico: Analítica básica + Radiografía torácica- 85€ (se realiza el mismo día).

Prequirúrgico premium: Analítica completa + Pruebas de coagulación + Radiografía de torax + Ecocardiografía - 120€ (se debe de programar días antes de la cirugía).

Estas pruebas no son obligatorias en todos los pacientes, pero reducen riesgos y nos permiten adaptar la anestesia a cada caso.

CONSIDERACIONES ANTES DE LA CIRUGÍA

Su mascota tiene programada una cirugía de castración. Para garantizar su seguridad, es fundamental seguir estas indicaciones preoperatorias:

Ayuno previo

Comida: no debe comer nada durante las 12 horas previas a la cirugía.

Agua: retirar el acceso al agua entre las 6:00 y 7:00 h de la mañana del día de la cirugía (o la noche anterior, si así se le indica).

Importante: es fundamental que no coma ni beba en el periodo indicado, ya que un estómago vacío reduce el riesgo de vómitos y aspiración durante la anestesia.

Cirugías por la tarde: aunque la intervención sea por la tarde, no debe desayunar.

Casos especiales: en cachorros, animales mini, diabéticos, geriátricos o con enfermedades previas, el ayuno puede necesitar ajustes para evitar hipoglucemias. Consúltenos antes de la cirugía para indicarle el ayuno más seguro en su caso.

Condiciones generales

La cirugía se realiza en animales sanos y estables. Si en los días previos observa vómitos, diarrea, decaimiento, tos, estornudos, fiebre o cualquier otro síntoma, avísenos con antelación. En algunos casos será más seguro reprogramar la intervención.

Vacunación y desparasitación: asegúrese de que su mascota tiene al día el plan vacunal y la desparasitación interna y externa. Si no es así, lo valoraremos en consulta y le indicaremos la mejor pauta.

Medicación

Si su mascota toma medicación habitual, infórmenos antes de la cirugía. Algunas pueden requerir ajuste o suspensión temporal.

El día de la cirugía

Acuda a la clínica a la hora indicada con su mascota en ayunas, según las indicaciones previas. Tráigalo con collar y correa (o en transportín si es gato). Si su mascota es nerviosa (especialmente gatos), puede traer una manta o prenda con su olor: ayuda a reducir el estrés. Recomendamos que haga sus necesidades antes de entrar a la clínica.

Consentimiento y dudas

El día de la cirugía deberá firmar el consentimiento informado. Si tiene dudas sobre la intervención, el postoperatorio o sobre los riesgos, estaremos encantados de explicárselo con detalle antes del procedimiento.

Alta médica

En general, los animales se entregan por la tarde del mismo día, cuando hayan despertado y estén estables. Le llamaremos para confirmar la hora exacta de recogida. No se recomienda llevarse a casa animales que sigan muy somnolientos o con temblores marcados: priorizamos que salgan estables y seguros.

CONSIDERACIONES DESPUES DE LA CIRUGÍA

Al llegar a casa

Su mascota puede estar somnolienta o algo desorientada durante las primeras horas por la anestesia. Ofrézcale un lugar tranquilo, cálido y sin ruidos para descansar. Evite que suba a sofás o camas: podría caerse o forzar la zona quirúrgica. Manténgalo en un espacio controlado (habitación o zona acotada) durante la primera noche. Es normal que esa primera noche duerma más o esté “raro”. Debería mejorar claramente en 12–24 horas.

Alimentación

Esta noche: puede ofrecerle una pequeña cantidad de comida ligera. Idealmente, puede usar comida “Digestive” en lata, disponible en nuestro centro. Si vomita, retire la comida y vuelva a ofrecerla al día siguiente en cantidad pequeña. Agua: siempre disponible, pero vigile que beba despacio y en pequeñas cantidades. Evite premios, huesos, comida grasa o cambios bruscos de dieta durante 3–5 días.

Cuidados de la herida

No bañar a su mascota hasta, como mínimo, 10 días. En la mayoría de casos no es necesario desinfectar la herida a diario, y hacerlo en exceso puede irritar la zona y aumentar el lamido/rascado. Si le indicamos realizar limpieza, puede usar Cristalmina o clorhexidina diluida al 50% con suero fisiológico. No recomendamos usar Betadine ni agua oxigenada, porque pueden irritar y retrasar la cicatrización. Revise la herida a diario: es normal un leve enrojecimiento y una ligera inflamación los primeros días. Ante cualquier duda, envíenos fotos o vídeos por WhatsApp. Una pequeña “bolita” bajo la piel puede ser una reacción al hilo o un seroma leve. Si aumenta de tamaño, duele, supura, huele mal o la zona se nota muy caliente, avísenos.

Evitar lamido o rascado

Es obligatorio el uso del collar isabelino durante 7-10 días. Incluso si lo ves tranquilo/a, puede lamerse cuando esté solo/a o por la noche. No recomendamos el body postquirúrgico como alternativa al collar isabelino. En nuestra experiencia, puede permitir lamidos/manipulación de la herida y aumentar el riesgo de inflamación, infección, apertura de puntos y necesidad de nueva visita o reintervención. Si es un gato y convive con otros, puede ser necesario separarlos los primeros días (especialmente las primeras 48-72 h) para evitar que le laman la herida, le quiten el collar/isabelino o lo inciten a jugar, lo que puede abrir puntos o inflamar la zona.

Medicación

Lleva mediación inyectada en el mismo día de la cirugía (antibiótico para 48h y antiinflamatorio para 24h). Se podrá llevar medicación adicional si es necesario (p. ej., para prevenir infecciones secundarias). Se la facilitaremos en clínica con la pauta correspondiente. Si hace falta, emitiremos receta electrónica. Además, le facilitaremos medicación antiinflamatoria/analgésica con su pauta para minimizar el dolor e inflamación. Si olvida una dosis, no duplique la siguiente. Si vomita tras la medicación oral, no repita la dosis sin consultarnos. Nunca administrar paracetamol en gatos, ni antiinflamatorios humanos en perros o gatos.

Actividad física

Reposo relativo: paseos cortos y siempre con correa, solo para hacer sus necesidades (sin tirones ni juegos). Evitar juegos, saltos y carreras durante 10 días para prevenir inflamación, sangrado o apertura de la herida/puntos. Si es un gato con acceso al exterior: mantenerlo en casa 7-10 días, en un ambiente controlado, para evitar peleas, saltos y contaminación de la incisión. En casa: limitar el acceso a sofás/camas/escaleras (habitación tranquila, sin estímulos).

Revisión

Si todo evoluciona con normalidad, no es imprescindible una revisión. Habitualmente realizamos suturas intradérmicas reabsorbibles, por lo que no es necesario retirar puntos. Si la sutura es externa (puntos por fuera), le daremos cita para revisión y retirada: aproximadamente perros a los 14 días y gatos a los 21 días. Aunque los puntos sean reabsorbibles, recomendamos revisión si aparece enrojecimiento intenso, secreción, apertura de la herida, mal olor, dolor marcado o lamido insistente.

Contactar con la clínica si observa

- Inflamación excesiva, sangrado o secreción en la herida.
- Fiebre, decaimiento persistente, vómitos o diarrea.
- Cualquier comportamiento anormal o que le preocupe.
- Acuda/consulte de urgencia si hay dificultad respiratoria, encías pálidas, colapso, sangrado que no cesa, o apertura evidente de la herida.

☎ 858 13 21 57

📞 633 93 78 92